

## Abstrakt

*Cíle:* V rámci výzkumného problému jsme sledovali šest dílčích cílů výzkumu. **Prvním cílem** výzkumu bylo **popsat sexuální chování uživatelů marihuany** ve vybraných oblastech sexuality na základě dat získaných dotazníkovým šetřením. Předložený výzkum byl zaměřen na heterosexuální muže, kteří pravidelně užívají marihuanu ve frekvenci 1x týdně až denně. **Druhým cílem** bylo nalézt souvislosti mezi **frekvencí užívání marihuany** a vybranými oblastmi sexuality. **Třetím cílem** naší práce bylo nalézt souvislosti mezi **délkou užívání marihuany** a vybranými oblastmi sexuality. **Čtvrtým cílem** výzkumu bylo nalézt souvislosti vlivu **užívání dalších psychoaktivních látek** uživateli marihuany u vybraných oblastí sexuality. **Pátým cílem** naší práce bylo zjistit souvislosti mezi **užíváním tabáku** v souboru uživatelů marihuany a vybranými oblastmi sexuality. **Šestým cílem** bylo nalézt souvislosti mezi užíváním marihuany a **erektilní funkcí**, respektive dysfunkcí, dle Indexu erektilní funkce muže (IIEF-5).

*Metoda:* Pro účely výzkumu jsme zvolili kvantitativní typ studie. Výběrový soubor čítal 392 respondentů, pravidelných heterosexuálních uživatelů marihuany užívajících marihuanu minimálně 1x týdně. Ke sběru dat byl použit nestandardizovaný dotazník, vycházející z dotazníku pro výzkum sexuálního chování v populaci ČR (Weiss, Zvěřina, 2001). Dále byl použit validizovaný Index erektilní funkce muže (IIEF-5). Statistické zpracování bylo provedeno s použitím statistického software "R" verze 3.0.2.

*Výsledky:* **V popisné části výzkumu bylo zejména zjištěno:** Uživatelé marihuany realizovali svůj první sexuální styk průměrně ve svých 16,1 letech. Více než dvě třetiny uživatelů (68,0%) měly v době prvního sexuálního styku již zkušenost s marihuanou. Nejčastěji uživatelé uváděli, že měli za celý život 4 sexuální partnerky, průměrný počet činil 14,5 sexuálních partnerek. Nadpoloviční většina uživatelů (59,3%) nezaznamenala žádnou změnu potřeby sexuálního uspokojení v souvislosti s užíváním marihuany, téměř čtvrtina uživatelů dále uvedla, že se jejich potřeba sexuálního uspokojení v souvislosti s užíváním marihuany zvýšila (24,4%). Nadpoloviční většina uživatelů (56,0%) vnímá délku soulože jako stejnou v porovnání s dobou před užíváním marihuany, více než třetina (39,0%) uživatelů uvádí, že v době před užíváním marihuany byla doba jejich soulože kratší. Více než třetina uživatelů (37,9%) vnímá v porovnání s dobou před užíváním marihuany své pocitové vyvrcholení (orgasmus) nyní jako lepší a další čtvrtina uživatelů jako podstatně lepší (25,1%), 33,2% uživatelů vnímá své pocitové vyvrcholení v porovnání s dobou před užíváním marihuany jako stejné. Nadpoloviční většina (53,7%) respondentů uvedla, že je se svým

sexuálním životem spokojena, 34,5% respondentů uvedlo, že jsou částečně spokojeni. Téměř polovina uživatelů dále uvedla, že se jejich pohlavní život od té doby, co užívají marihuanu, změnil k lepšímu (48,1%), další téměř polovina (45,8%) respondentů uvedla, že se jejich pohlavní život nezměnil. Téměř polovina uživatelů marihuany (46,0%) jako nejčastější pozitivní změnu uváděla lepší prožitek orgasmu, následovalo 37,1% uživatelů, kteří uváděli zvýšenou sexuální vzrušivost. Nedostavení se erekce při sexuálním styku 53,9% respondentů nikdy nezažilo, jednou nebo dvakrát tuto situaci zažila třetina respondentů (33,4%). Nedostavení se ejakulace při sexuálním styku 69,2% uživatelů nezažilo nikdy, 28,8% uživatelů tuto situaci zažilo někdy. Zkušenost s využitím komerčního sexu má 20,3% respondentů. Naprostá většina uživatelů marihuany nikdy neposkytla sexuální služby za úplatu (93,6%). Většina uživatelů (89,0%) marihuany neměla nikdy pohlavní styk s mužem, 5,6% uživatelů realizovalo pohlavní styk s mužem jednou. Za bisexuálně orientované se považuje 11,3% respondentů.

**V analytické části výzkumu bylo zejména zjištěno:** Frekvence užívání marihuany souvisí s přítomností poruchy erekce, povaha této závislosti – středně těžcí a těžcí uživatelé marihuany uváděli nižší četnost výskytu nedostavení se erekce. Souvislost mezi výstupy z Indexu erektilní funkce muže (IIEF-5) a sledovanými znaky, včetně frekvence užívání marihuany následně prokázána nebyla. Délka užívání marihuany souvisí s přítomností poruchy ejakulace, povaha této závislosti – uživatelé, u nichž se ejakulace někdy nedostavuje, užívají marihuanu delší dobu. Užívání dalších psychoaktivních látek souvisí s počtem sexuálních partnerek, povaha této závislosti – respondenti užívající kromě marihuany ještě jiné drogy (pervitin, kokain, extáze, LSD, halucinogenní houby, ketamin) uváděli vyšší počet sexuálních partnerek. Užívání dalších psychoaktivních látek souvisí s počtem příležitostných sexuálních partnerek, povaha této závislosti – respondenti užívající kromě marihuany ještě jiné drogy (pervitin, kokain), uváděli vyšší počet náhodných sexuálních partnerek. Užívání dalších psychoaktivních látek souvisí s měsíční sexuální aktivitou, povaha této závislosti – respondenti užívající kromě marihuany ještě jiné drogy (pervitin, kokain), vykazují nižší měsíční sexuální aktivitu. Užívání tabáku souvisí s délkou milostné přede hry, povaha závislosti – uživatelé marihuany, kteří neužívají tabákové cigarety, uvádějí delší dobu milostné přede hry.

*Závěr:* Přestože soubor uživatelů marihuany vykazuje některé specifické rysy v oblasti sexuality, nejedná se o závažnou rizikovost v oblastech sexuálního chování a sexuálního zdraví.

**Klíčová slova**

Erektivní dysfunkce, marihuana, sexualita, sexuální chování, sexuální zdraví, uživatelé drog, uživatelé marihuany