

Přílohy



Příloha 1: Umístění krmítka A.



Příloha 2: Umístění krmítka B.

název druhu	čeleď	celkový počet přiletů	podíl návštěv krmítek během testování vůči celkovému počtu testování
Pěnkava jíkavec (<i>Fringilla montifringilla</i>)	<i>Fringillidae</i>	25	18%
Pěnkava onečná (<i>Fringilla coelebs</i>)	<i>Fringillidae</i>	15	9%
Dlask tlustozobý (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	<i>Fringillidae</i>	69	51%
Stehlík obecný (<i>Carduelis carduelis</i>)	<i>Fringillidae</i>	73	54%
Čížek lesní (<i>Spinus spinus</i>)	<i>Fringillidae</i>	1	1%
Červenka obecná (<i>Erithacus rubecula</i>)	<i>Muscicapidae</i>	10	7%
Brhlík lesní (<i>Sitta europaea</i>)	<i>Sittidae</i>	121	89%
Kos černý (<i>Turdus merula</i>)	<i>Turdidae</i>	56	41%
Drozd kvičala (<i>Turdus pilaris</i>)	<i>Turdidae</i>	1	1%
Strakapoud velký (<i>Dendrocopos major</i>)	<i>Picidae</i>	4	3%
Sojka obecná (<i>Garrulus glandarius</i>)	<i>Corvidae</i>	1	1%
Bažant obecný (<i>Phasianus colchicus</i>)	<i>Phasianidae</i>	9	7%

Příloha 3: Přiletý na krmítka ostatních ptačích druhů během prezentace atrap v experimentu 1.

název druhu	čeleď	celkový počet přiletů	podíl návštěv krmítek během testování vůči celkovému počtu testování
Pěnkava jíkavec (<i>Fringilla montifringilla</i>)	<i>Fringillidae</i>	93	67%
Pěnkava onečná (<i>Fringilla coelebs</i>)	<i>Fringillidae</i>	10	7%
Dlask tlustozobý (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	<i>Fringillidae</i>	37	27%
Stehlík obecný (<i>Carduelis carduelis</i>)	<i>Fringillidae</i>	19	14%
Čížek lesní (<i>Spinus spinus</i>)	<i>Fringillidae</i>	9	7%
Červenka obecná (<i>Erithacus rubecula</i>)	<i>Muscicapidae</i>	9	7%
Brhlík lesní (<i>Sitta europaea</i>)	<i>Sittidae</i>	52	39%
Kos černý (<i>Turdus merula</i>)	<i>Turdidae</i>	60	44%
Strakapoud velký (<i>Dendrocopos major</i>)	<i>Picidae</i>	22	16%
Sojka obecná (<i>Garrulus glandarius</i>)	<i>Corvidae</i>	1	1%
Bažant obecný (<i>Phasianus colchicus</i>)	<i>Phasianidae</i>	6	4%

Příloha 4: Přiletý na krmítka ostatních ptačích během prezentace atrap v experimentu 2.